О.Н. Федотовская¹, Н.Д. Гольберг¹, С.И. Глушков¹,
С.Н. Жерегеля^{1,2}, И.И. Ахметов¹

Взаимосвязь полиморфизма гена *G6PC2* с изменением уровня глюкозы крови при физической нагрузке

¹Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры, Санкт-Петербург

²Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Резюме. Известно, что при выполнении физической нагрузки глюкоза используется в качестве энергетического субстрата в процессах анаэробного гликолиза и аэробного окисления. Многочисленными исследованиями показано, что однонуклеотидный полиморфизм гена *G6PC2* (G/A, rs560887), кодирующего белок каталитической субъединицы глюкозо-6-фосфатазы 2 типа, определяет индивидуальные различия в концентрации глюкозы крови натощак (в пределах физиологической нормы). Исследована взаимосвязь полиморфного варианта гена *G6PC2* (G/A) с изменением уровня глюкозы крови при выполнении физической нагрузки до отказа. В исследовании приняли участие 69 спортсменов, занимающихся лыжными гонками. Генотипирование осуществляли с помощью полимеразной цепной реакции и последующего рестрикционного анализа. Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли энзиматическим колориметрическим методом после выполнения ступенчато-повышающейся нагрузки на тредбане. Установлено, что среди обследованных спортсменов *G6PC2**A аллель встречается статистически значимо реже, чем у жителей России (18,1 против 25,6%; $p=0,05$). Показано, что носительство *G6PC2**G аллеля ассоциировано с незначительно повышенной концентрацией глюкозы в крови у лыжников-гонщиков, что согласуется с литературными данными, а также с большим приростом значений концентрации глюкозы крови после выполнения ступенчато-повышающейся физической нагрузки до отказа.

Ключевые слова: полиморфизм гена, *G6PC2*, глюкоза, кровь, лыжные гонки, полимеразная цепная реакция, физическая нагрузка, тредбан, энергообеспечение мышечной деятельности.

Введение. Успешная реализация многолетней международной программы «Геном человека» оказала большое влияние на фундаментальную и прикладную медико-биологическую науку [2]. Результаты многочисленных исследований указывают на важную роль генетических факторов наряду с эпигенетическим воздействием и факторами внешней среды в детерминации индивидуальных различий в развитии и проявлении физических качеств и адаптационных возможностей человека [1, 4].

Глюкоза является основным и наиболее универсальным источником энергии для обеспечения метаболических процессов организма. Степень утилизации глюкозы мышцами зависит от эффективности процессов ее доставки к мышечным клеткам (концентрация глюкозы крови, скорость кровотока), эффективности ее транспорта через мембраны мышечных клеток (плотность и активность транспортеров глюкозы – GLUT, градиент концентрации глюкозы) и эффективности реакций метаболизма в мышечных клетках (доступность субстратов, гексокиназная реакция) [15]. Определено, что в европейской популяции от 25 до 50% разнообразия в уровне глюкозы крови определяется генетическими особенностями, а также различными эффектами ген-генных и ген-средовых взаимодействий [10].

Для определения молекулярно-генетических основ вариативности уровня глюкозы в крови была прове-

дена серия полногеномных исследований ассоциаций значений концентрации глюкозы с генетическими вариациями. Выявлен полиморфизм rs560887, наиболее значимо ассоциирующийся с уровнем глюкозы крови ($p=4,0 \times 10^{-7}$) [5]. Взаимосвязи данного полиморфизма с диабетом 2 типа или индексом массы тела обнаружено не было. Результаты мета-анализа подтвердили наличие ассоциации полиморфизма rs560887 с уровнем глюкозы в крови ($p=8,7 \times 10^{-218}$) [8]. При обследовании жителей России также выявлена ассоциация полиморфизма rs560887 с базальным уровнем глюкозы крови [3].

Полиморфизм rs560887 представляет собой замену нуклеотида G на A в третьем интроне гена *G6PC2* (OMIM: *608058). Ген локализован в длинном плече 2 хромосомы (2q24-q31), состоит из 5 экзонов и 4 интронов. Показано, что чем больше G аллелей в генотипе (AG и GG генотипы), тем больше концентрация глюкозы в крови [5, 16]. Мыши, нокаутированные по гену *G6pc2*, по сравнению с дикими сородичами, в возрасте 16 недель имели пониженную (на 13%) концентрацию глюкозы крови [18]. При этом у мышей отсутствовали какие-либо изменения в весе, концентрациях инсулина и глюкагона крови.

Известно, что ген *G6PC2* кодирует белок каталитической субъединицы глюкозо-6-фосфатазы 2 типа (Г6ФК2), КФ 3.1.3.93, экспрессирующийся тканеспецифично в β -клетках островков Лангерганса

поджелудочной железы [12]. Белок является частью мультикомпонентного комплекса белков в мембране, играющих важную роль в контроле метаболизма глюкозы [13]. Поступая из кровотока в β -клетки островков Лангерганса поджелудочной железы посредством переносчика GLUT 2, глюкоза фосфорилируется глюкокиназой с образованием глюкозо-6-фосфата, от количества которого в β -клетках зависит интенсивность процессов синтеза и секреции инсулина [11].

Считается, что глюкокиназа в β -клетках выполняет роль сенсора к глюкозе, контролируя скорость входа глюкозы в гликолитический механизм и инициируемую глюкозо-6-фосфатом активацию секреции инсулина в кровотока. Г6ФК2 катализирует обратную реакцию гидролиза глюкозо-6-фосфата с образованием глюкозы и неорганического фосфата и также является компонентом этого сенсора. Фермент существует в виде сложного функционального комплекса с транспортерами глюкозо-6-фосфата [9], неорганического фосфата и глюкозы, которые доставляют образованный в цитозоле глюкозо-6-фосфат в просвет эндоплазматического ретикулума и возвращают продукты реакции обратно в цитозоль [14].

Гидролазная активность Г6ФК2 является антагонистом глюкокиназы и, следовательно, влияет на весь сигнальный каскад, который влечет за собой секрецию инсулина. Вызванные Г6ФК2 изменения метаболизма глюкозы в β -клетках также влияют на активность P13-киназы, которая регулирует панкреодуоденальный гомеобокс-1 (PDX1) связываясь с геном инсулина, что влечет за собой усиление транскрипции гена инсулина [17].

Ранее нами [3] было показано, что среди квалифицированных спортсменов чаще встречаются носители *G6PC2*GG* генотипа, чем в группе лиц без стажа регулярных занятий какими-либо видами спорта. Учитывая роль G/A полиморфизма гена *G6PC2* в регуляции уровня глюкозы в крови, можно предположить, что носительство определенного аллеля гена *G6PC2* может влиять на эффективность выполнения физических нагрузок.

Цель исследования. Выявить взаимосвязь полиморфизма гена *G6PC2* (G/A) с изменением уровня глюкозы крови при выполнении физической нагрузки до отказа квалифицированными лыжниками-гонщиками.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 69 спортсменов, занимающихся лыжными гонками (женщины 17,8±3,5 лет, n=23; мужчины 19,2±2,7 лет, n=46). На момент исследования 16 спортсменов являлись мастерами спорта, 33 – кандидатами в мастера спорта и 20 спортсменов имели 1 взрослый разряд.

Выделение дезоксирибонуклеиновой кислоты проводили из клеток буккального эпителия сорбентным методом в соответствии с прилагаемой инструкцией по применению к комплексу «ДНК-сорб-А» (Центральный НИИ эпидемиологии МЗ РФ). Анализ полиморфизма гена проводили методом полимеразной цепной реакции. Ампликоны обрабатывались эндонуклеазой рестрикции Bst4C I («СибЭнзим», Россия). Анализ длин рестрикционных фрагментов продуктов проводили путем электрофоретического разделения в 12% полиакриламидном геле с последующей окраской бромистым этидием и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете при помощи трансиллюминатора.

Определение концентрации глюкозы проводили в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом с использованием наборов реагентов фирмы «Ольвекс-Диагностикум» (Россия). Измерения проводили натошак до и после выполнения ступенчатоповышающейся нагрузки на тредбане «Saturn» (h/p/Cosmos, Германия). Начальная нагрузка для мужчин – 6 км/ч, для женщин – 5 км/ч, длительность ступени 3 мин, шаг – увеличение угла наклона на 2,5% и скорости (мужчины – 6 км/ч, 9 км/ч, 12 км/ч; женщины – 5 км/ч, 8 км/ч, 10 км/ч). Работа выполнялась до отказа.

Статистическая обработка данных выполнена с применением компьютерной программы «GraphPad InStat». Определяли: средние значения (M), стандартную ошибку ($\pm$ SEM). Значимость различий в частоте аллелей между сравниваемыми выборками определяли с использованием критерия хи-квадрат или точного теста Фишера. Сравнение групп по количественному признаку (концентрация глюкозы) проводили с помощью дисперсионного анализа ANOVA. Различия считались статистически значимыми при $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что распределение частот генотипов гена *G6PC2* у лыжников-гонщиков значимо не отличаются от популяционных данных (табл.). Частота редкого *G6PC2*A* аллеля составила 18,1% и не отличалась в группах женщин и мужчин (19,6 против 17,4%, $p=0,88$) и была значимо ниже, чем в популяции жителей России (18,1 против 25,6%, $p=0,05$). Полученные результаты согласуются с данными о преобладании среди спортсменов – носителей *G6PC2*GG* генотипа [3].

Значения концентрации глюкозы у всех обследованных лыжников-гонщиков были в пределах физиологической нормы. Показано, что носительство *G6PC2*A* аллеля ассоциируется с незначительно более низкой концентрацией глюкозы в крови натошак (GG – 4,15±0,14 мМ, GA – 4,10±0,15 мМ, AA – 4,01±0,34 мМ; $p=0,7$).

Выявлена взаимосвязь генотипов *G6PC2* с изменением уровня глюкозы крови в результате выполнения квалифицированными лыжниками-гонщиками физической нагрузки до отказа. Среди обследованных спортсменов – носителей генотипа *G6PC2*AA* наблюдался больший прирост значений концентрации

Таблица

Относительное распределение генотипов и аллелей гена *G6PC2* в группе квалифицированных лыжников-гонщиков и у жителей России

Обследуемый контингент	n	Генотипы <i>G6PC2</i> , %				Аллель, %	
		GG	GA	AA	p_1	A	p_2
Лыжники-гонщики	69	66,7	30,4	2,9	0,14	18,1	0,05*
Жители России [3]	837	55,3	38,1	6,6	1	25,6	1

Примечание: * – различия между лыжниками-гонщиками и жителями России ($p \leq 0,05$); p_1 – при сравнении генотипов; p_2 – значение p при сравнении аллелей.

глюкозы крови (GG – $2,97 \pm 0,22$ мМ, GA – $2,35 \pm 0,31$ мМ, AA – $1,72 \pm 0,73$ мМ; $p=0,09$), рисунок.

Эффективность потребления глюкозы мышцами зависит от концентрации глюкозы крови. Следствием повышения уровня глюкозы крови во время упражнений является пропорциональное увеличение потребления глюкозы мышцами [7]. При обследовании физически активных людей было выявлено значимое увеличение концентрации глюкозы крови натощак после аэробных тренировок по сравнению с уровнем до тренировок [6].

Заключение. Концентрация глюкозы крови, определяемая, в том числе, генетическими вариациями, влияет на эффективность энергообеспечения мышечной деятельности. Это подтверждается обнаруженным фактом преобладания среди обследованных лыжников-гонщиков – носителей *G6PC2*G* аллеля. На основании выявленной тенденции к увеличению прироста уровня глюкозы крови после физической нагрузки с увеличением количества G аллелей в генотипе можно предположить, что носительство *G6PC2*G* аллеля повышает эффективность энергообеспечения мышечной деятельности. Вместе с тем полученные результаты необходимо рассматривать как предварительные ввиду небольшой выборки обследованных спортсменов. Однако они вносят определенный вклад

в разработку комплекса по оценке наследственно-обусловленных особенностей обмена веществ и генетического потенциала организма спортсмена.

Литература

1. Баранов, В.С. Экогенетика, предиктивная медицина и генетический паспорт / В.С. Баранов // Вестн. Рос. воен.-мед. акад. – 2008. – № 3 (23). – С. 15.
2. Рогозкин, В.А. Гены-маркеры предрасположенности к скоростно-силовым видам спорта / В.А. Рогозкин [и др.] // Теор. и практ. физ. культ. – 2005. – № 1. – С. 2–4.
3. Федотовская, О.Н. Полиморфизм гена *G6PC2* у спортсменов / О.Н. Федотовская, А.В. Борисова, И.И. Ахметов // Физкульт. в профил., леч. и реабил. – 2011. – № 1–2 (36–37). – С. 5–9.
4. Ahmetov, I.I. Genes, athlete status and training – An overview / I.I. Ahmetov, V.A. Rogozkin // In: Genetics and sports, ed.: Collins M. – Med. sport sci. Basel, Karger, 2009. – Vol. 54. – P. 43–71.
5. Bouatia-Naji, N. A polymorphism within the *G6PC2* gene is associated with fasting plasma glucose levels / N. Bouatia-Naji [et al.] // Science. – 2008. – Vol. 320 (5879). – P. 1085–1088.
6. Boule, N.G. Effects of exercise training on glucose homeostasis: the HERITAGE Family Study / N.G. Boule [et al.] // Diabetes care. – 2005. – Vol. 28. – P. 108–114.
7. DeFronzo, R.A. Synergistic interaction between exercise and insulin on peripheral glucose uptake / R.A. DeFronzo [et al.] // J. clin. invest. – 1981. – Vol. 68. – P. 1468–1474.
8. Dupuis, J. New genetic loci implicated in fasting glucose homeostasis and their impact on type 2 diabetes risk / J. Dupuis [et al.] // Nat. genet. – 2010. – Vol. 42 (2). – P. 105–116.

Рис. Зависимость концентрации глюкозы крови и прироста уровня глюкозы крови после выполнения физической нагрузки до отказа от генотипов *G6PC2*

9. Gerin, I. Sequence of a putative glucose 6-phosphate translocase, mutated in glycogen storage disease type Ib / I. Gerin [et al.] // FEBS lett. – 1997. – Vol. 419. – P. 235–238.
10. Henkin, L. Genetic epidemiology of insulin resistance and visceral adiposity. The IRAS family study design and methods / L. Henkin [et al.] // Ann. epidemiol. – 2003. – Vol. 13 (4). – P. 211–217.
11. Leahy, J.L. Beta-cell dysfunction induced by chronic hyperglycemia: current ideas on mechanism of impaired glucose-induced insulin secretion / J.L. Leahy, S. Bonner-Weir, G.C. Weir // Diabetes care. – 1992. – Vol. 15. – P. 442–455.
12. Martin, C.C. Cloning and characterization of the human and rat islet-specific glucose-6-phosphatase catalytic subunit-related protein (IGRP) genes / C.C. Martin [et al.] // J. biol. chem. – 2001. – Vol. 276 (27). – P. 25197–25207.
13. Matschinsky, F.M. Banting Lecture 1995. A lesson in metabolic regulation inspired by the glucokinase glucose sensor paradigm / F.M. Matschinsky // Diabetes. – 1996. – Vol. 45. – P. 2223–2241.
14. Mithieux, A. Novel Role for Glucose 6-Phosphatase in the Small Intestine in the Control of Glucose Homeostasis / G. Mithieux, F. Rajas, A. Gautier-Stein // J. boil. chem. – 2004. – Vol. 279 (43). – P. 44231–44234.
15. Rose, A.J. Skeletal Muscle Glucose Uptake During Exercise: How is it Regulated? / A.J. Rose, E.A. Richter // Physiology. – 2005. – Vol. 20. – P. 260–270.
16. Rose, C.S. A variant in the G6PC2/ABCB11 locus is associated with increased fasting plasma glucose, increased basal hepatic glucose production and increased insulin release after oral and intravenous glucose loads / C.S. Rose [et al.] // Diabetologia. – 2009. – Vol. 52. – P. 2122–2129.
17. Vaulont, S. Glucose regulation of gene transcription / S. Vaulont, M. Vasseur-Cognet, A. Kahn // J. biol. chem. – 2000. – Vol. 275 (41). – P. 31555–31558.
18. Wang, Y. Deletion of the gene encoding the islet-specific glucose-6-phosphatase catalytic subunit-related protein autoantigen results in a mild metabolic phenotype // Y. Wang [et al.] // Diabetologia. – 2007. – Vol. 50 (4). – P. 774–778.

O.N. Fedotovskaya, N.D. Golberg, S.I. Glushkov, S.N. Jeregelya, I.I. Ahmetov

Association of G6PC2 gene polymorphism with blood glucose level during exercise

Abstract. It is known, that in the processes of anaerobic glycolysis and aerobic oxidation glucose is used as an energy fuel. Numerous studies have shown that G6PC2 gene polymorphism (G/A, rs560887), which encodes catalytic subunit of glucose-6-phosphatase type 2 protein, determines individual differences in the concentrations of fasting plasma glucose (within physiological limits). The purpose of this study was to identify the relationship of G/A G6PC2 gene polymorphism with changes in fasting plasma glucose levels when performing physical exercise to failure. The study involved 69 athletes (cross-country skiing). Genotyping was performed by polymerase chain reaction and subsequent restriction analysis. The concentration of glucose in blood serum were determined by enzymatic colorimetric method after step-increase load on a treadmill. The frequency of G6PC2*A allele was lower in a group of cross-country skiers comparing with Russian population (18,1 vs. 25,6%; $p=0,05$). It is shown that carriage of G6PC2*G allele is associated with significantly higher concentration of blood glucose of cross-country skiers, which is consistent with published data, as well as with greater increase of blood glucose concentration after a step-increase load to failure.

Key words: gene polymorphism, G6PC2, glucose, blood, cross-country skiing, polymerase chain reaction, physical activity, treadmill, energy supply of muscular activity.

Контактный телефон: +7 921 426-99-27; e-mail: o.fedotovska@mail.ru