

Участие в клинических исследованиях за последние 24 года

Препараты для лечения:

- сифилиса – Benzathine Benzylpenicillin (Retarpen) (1995) (IV фаза);
- псориаза – Elocom (Mometasone furoate) (1997) (IV фаза);
- псориаза – Neotigason (Acitretin) (1997-1998) (IV фаза);
- генитального герпеса – Epigent intimo (1997) (IV фаза);
- гнойничковой инфекции – Банеоцин (1997) (IV фаза);
- острой и хронической крапивницы – Kestine (Ebastine) (1998) (IV фаза);
- чесотки – Spregal (1998) (IV фаза);
- отрубевидного лишая – Lamizil spray (1998) (IV фаза);
- микозов стоп – мифунгар (Oxiconazole nitrate) (1999) (IV фаза);
- урогенитальных инфекций (микоуреаплазмоза) – Ofloxin (2000 – 1999) (IV фаза);
- себореи – Ясмин (2001) (III фаза);
- урогенитальных инфекций (хламидиоза, микоуреаплазмоза) – Спарфло (2002) (IV фаза);
- псориаза – Велосалик (2002) (IV фаза);
- микозов стоп – Низорал крем (2001) (IV фаза);
- гнойничковой инфекции – Бактробан (2002) (IV фаза);
- профилактике микозов стоп – Дактарин (2002) (IV фаза);
- урогенитальных инфекций (трихомоноза) – Солкотриховак (2002-2003) (IV фаза);
- себореи – Диане 35 (2002-2003) (III фаза);
- псориаза – Онерсепт (2002-2003) (II фаза);
- псориаза и атопического дерматита – Иммуноспорин (2002-2003) (IV фаза);
- остроконечных кондилом – (2003) (III фаза);
- микозов стоп – Фунготербин (2003) (IV фаза);
- себореи – Дифферин (2003) (IV фаза);
- онихомикоза – Ирунин (2003) (IV фаза);
- микозов стоп – Тербифин (2003) (IV фаза);
- атопического дерматита – Элидел (2003) (IV фаза);
- псориаза – Раптив (2003-2004) (III фаза);
- острая и хроническая крапивница – Эбастин (2003-2004) (III фаза);
- псориаза – (2004-2005) (III фаза);
- себореи – (2004-2005) (III фаза);
- алопеции – Алерана (2004-2005) (IV фаза);
- кандидоза – Итразол (2004-2005) (IV фаза);
- онихомикоза – Итразол (2004-2005) (IV фаза);
- гнойничковой инфекции – Аргосульфан (2005) (IV фаза);
- псориаза – Кериум (2005) (IV фаза);
- себорейного дерматита – Керион (2005) (IV фаза);
- простой перхоти – Кериум (2005) (IV фаза);
- алопеции – Лева (коллоидное серебро) (2005) (IV фаза);
- гипергидроза – Серебряный башмачок (коллоидное серебро) (2005) (IV фаза);
- себореи – Елена (коллоидное серебро) (2005) (IV фаза);

- микозов стоп – Кандид (2005-2006) (IV фаза);
- псориаза – Сориатан (2005) (IV фаза);
- лимфомы кожи – (2005) (II фаза);
- псориаза – (2006-2007) (III фаза);
- онихомикоза – Тербинафин (2008-2009) (IV фаза);
- постгерпетической невралгии – ТАК-583 (2006) (II фаза);
- лимфомы кожи – (2006-2008) (III фаза);
- псориаза – (2006-2007) (III фаза);
- вульвовагиниты – (2008-2010) (III фаза).